


梅毒可以治愈吗？

可以，梅毒通常通过抗生素注射进行治疗。尽管患者已经被成功的治愈，但如果再次接触病毒会造成二次感染。必须在性交时使用安全套以减低感染梅毒或者其他 STI 的风险。

我的性伴侣应该接受治疗吗？

是。如果你和未接受治疗的人进行性交，会造成二次感染。



感染梅毒不进行救治会有怎样的后果？

如果不进行救治，梅毒会导致严重的健康隐患。长期感染而不进行治疗会损伤内脏。此外，感染梅毒的人感染艾滋的可能性更高。

梅毒会影响孕妇及她的胎儿吗？

会。梅毒会给孕妇和她的胎儿带来严重的健康问题。

怎样避免感染梅毒？

100% 避免感染梅毒的唯一有效方式是禁欲。如果进行性行为，你可以采取以下措施避免感染：

- 肛交、性交和/或口交时使用乳胶或聚氨酯避孕套或阻隔膜（牙用橡皮障）
- 天然材料制作的避孕套能够避免怀孕，但是无法预防 STI 疾病
- 如果你选择进行性行为，则减少性伴侣数量
- 与性伴侣讨论他们的 STI 状况，并让他们接受检查
- 向你的医护人员咨询安全的性行为准则并接受检测
- 了解在毒品和/或酒精影响下发生性行为会增加未经保护性行为的可能性。

欲了解更多信息，请浏览以下网页：

<http://www.bphc.org/whatwedo/sexual-health>

或 <http://www.cdc.gov/std>

Chinese | October 2015

梅毒



Boston Public Health Commission
Infectious Disease Bureau
1010 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02118
www.bphc.org
617-534-5611

Chinese

什么是梅毒?

梅毒是由于细菌导致的传染性性疾病 (STI)。

人们通过什么渠道感染梅毒?

梅毒会通过与其接触的肌肤直接接触进行传播。梅毒细菌存在于阴道、阴茎、肛门、口腔、嘴唇或直肠中。梅毒细菌通过性交、肛交或口交的性传播方式扩散。如果人们没看到或感觉到梅毒溃疡，梅毒也会扩散，因此人们经常在不知不觉中感染梅毒。梅毒也会通过母婴传播方式进行扩散。

以下行为会增加感染风险:

- 没有使用乳胶或者聚氨酯避孕套进行性交
- 拥有多个性伴侣
- 感染其他的 STI 或者 HIV
- 吸毒或者饮酒后性交 (这些情况下正确使用避孕套的可能性更低)

什么样的人群会感染梅毒?

任何进行性生活的人都有可能感染梅毒。进行不安全性行为 (不使用避孕套) 增加了感染的机率。尽管男性和女性都有可能感染，但是在美国所有感染病例中，超过半数都是男同性恋的病例 (MSM)。

梅毒的症状有哪些?

梅毒的症状不尽相同，具体取决于疾病阶段。疾病分为四个时期：初期、中期、潜伏期和晚期。

初期症状

- 在生殖器、口腔、肛门或者直肠里有一个或者多个无痛溃疡 (硬下疳)。
- 溃疡持续 3 到 6 周，自动消失。但如果你没有接受治疗，那么疾病会继续发展至下一阶段。

中期症状

- 手脚或者身体其他部位出现皮疹，皮疹通常为红色或者褐色，一般没有发痒的感觉。
- 其他症状包括发烧、喉咙痛、肌肉酸痛、头痛、脱发和乏力。这些症状会自动消失，但如果不接受治疗，疾病会发展至下一阶段。

潜伏期症状

- 没有症状，但是疾病会通过血液检测查出。这一阶段可持续数年。

晚期症状

- 症状可能包括手脚不灵活、瘫痪、麻痹、失明和心脏病。

感染者在多久的时间之内可以传播梅毒?

未接受治疗的患者最有可能在感染的第一年将疾病传染给他人。感染者不接受治疗拖延的时间越久，引发严重长期问题的风险越大。

如何检测我是否感染梅毒?

准确判断的唯一方法就是接受检查。医护人员通常会通过血液样本进行梅毒检测。因为未检测的梅毒会影响到胎儿，所有怀孕的妇女应当进行梅毒检测。所有因为进行性行为而面临梅毒风险的人都应当接受定期检测，以便他们在确定感染后迅速接受治疗。

我在何处接受检测?

大部分医疗机构都会提供梅毒检测或者其他 STI 的检测。若要找到您所在地附近的医疗中心，请拨打市长健康热线 617-534-5050 或者浏览网页 <http://www.hivtest.org/STDTesting.aspx>

