


Quais doenças você pode contrair através de mordidas de cão?

Mordidas de cão não só podem causar lesão, como também podem transmitir germes. Até 18% das mordidas de cão acabam infeccionando. Foram encontrados mais de 60 tipos diferentes de bactérias na boca do cão, mas apenas um pequeno número desses germes pode fazer com que você adoça.

Raiva é uma das doenças mais graves que as pessoas podem contrair a partir de mordidas de cão. Contrair raiva de um cão nos Estados Unidos é muito raro. A raiva é um vírus que afeta o cérebro e pode ser fatal. A forma mais comum da raiva ser transmitida é através da mordida de um animal infectado. A doença pode ser prevenida pela vacinação dos cães. Além disso, pessoas que são mordidas por um animal com raiva devem receber tratamento

Os médicos em Boston são obrigados a relatar todas as mordidas de animais para a BPHC. A BPHC trabalha com prestadores de serviços de saúde e Controle de Zoonoses de Boston para garantir que todos os tratamentos necessários e o acompanhamento sejam feitos.



Assim como as pessoas, **cães são muito bons em se comunicar**, mas é preciso prática para as pessoas entenderem a expressão facial e corporal. A maioria das pessoas pode reconhecer os sinais de um cão agressivo que não quer ser tocado (mostrando os dentes, rosnando). No entanto, muitas mordidas de cão ocorrem porque as pessoas não percebem os sinais de que um cão quer ser deixado em paz, mesmo que o cão não pareça estar com raiva ou incomodado. Alguns sinais de um cão medroso ou estressado que são facilmente despercebidos incluem:

- Cabeça baixa, com pescoço baixo, ou virada para o outro lado.
- Rabo baixo, escondido entre as pernas, ou abanando lentamente.
- Boca fechada.
- Orelhas para trás ou para baixo.
- O levantar das costas, principalmente perto do rabo.
- Estar ereto ou tenso em todo corpo, com muito frio ou tremendo.
- Olhar arregalado, mostrando a parte branca dos olhos do cão mais do que o habitual.
- Latindo repetidamente com ganidos ou latidos curtos e agudos.
- Agindo de forma inquieta.
- Tentando se esconder dentro ou atrás das coisas.
- Bocejo rápido.
- Salivação excessiva.
- Não interessado em comida.
- Respiração curta ou rápida.
- Comportamento nervoso, como lamber os lábios ou se coçar como se tivesse uma coceira.

Para saber mais sobre a prevenção da mordida de cão, visite nosso [site](#).

Prevenção contra mordida de cão



Boston Public Health Commission
Infectious Disease Bureau
1010 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02118
www.bphc.org
617-534-5611

Aproximadamente 4,5 milhões de mordidas de cão ocorrem a cada ano nos Estados Unidos. Aprenda a evitar mordidas de cão e reduzir o risco de doença e lesão!

Quem está em maior risco de ser mordido por cães?

Crianças. A taxa de lesões relacionadas a mordidas de cão é maior em crianças de 5 a 9 anos de idade. As crianças são mais suscetíveis do que adultos a receber cuidados médicos relacionados a mordidas de cão. Os idosos são as segundas

vítimas mais comuns de mordidas de cão.



Onde acontecem as mordidas de cão?

Mais da metade das lesões relacionadas a mordidas de cão ocorrem em casa com cães conhecidos. Entre crianças e adultos, ter um cão em casa está associado com uma maior probabilidade de ser mordido. Conforme aumenta o número de cães em residências, aumenta também a chance de ser mordido.

Prevenindo mordidas de cão: Dicas básicas de segurança

Helpful
Tips

O que você deve fazer:

- Ficar imóvel (“fique parado como uma estátua”) quando abordado por um cão desconhecido. Fique imóvel e calmo.
- Evitar o contato visual direto com cães desconhecidos.
- Esperar o cão passar
- Se um cão te derrubar, enrole-se (como um caracol) com sua cabeça protegida e suas mãos cobrindo suas orelhas e pescoço.
- Avisar imediatamente um adulto sobre cães de rua ou cães que estão se comportando de forma estranha.

O que você não deve fazer:

- Se aproximar de um cão não familiar.
- Correr de um cão.
- Entrar em pânico ou fazer muito barulho.
- Perturbar um cão que está dormindo, comendo ou cuidando de seus filhotes.
- Passar a mão em um cão antes de perguntar ao seu dono se não há problemas em fazê-lo.
- Passar a mão em um cão sem deixar que o veja ou cheire antes.
- Incentivar o seu cão a brincar de forma agressiva.
- Deixar crianças pequenas brincar com um cão sem supervisão.



E se você for mordido ou atacado por um cão?

- Se possível, ponha sua bolsa, mochila ou casaco entre você e o cão para se proteger.
- Se você for derrubado, enrole-se (como um caracol) com sua cabeça protegida e suas mãos cobrindo suas orelhas e pescoço.
- Quando chegar a um lugar seguro lave imediatamente quaisquer feridas com água e sabão.
- Procure atendimento médico. Você pode precisar de antibióticos ou outro tratamento.
- Não se esqueça de procurar assistência médica imediatamente se:
 - O ferimento for grave (hemorragia não controlada, fraqueza, dor severa, exposição do músculo ou osso).
 - O ferimento ficar vermelho, doloroso, quente ou inchado, ou você tiver febre.
- Embora o risco seja pequeno, cães podem ser portadores de raiva. Se você for mordido, contate o seu médico, Boston Animal Control (Agência de Controle de Zoonoses de Boston) através do telefone 617-635-5348 ou a Comissão de Saúde Pública de Boston (BPHC) através do telefone 617-534-5611.
- Quando o incidente é relatado para a BPHC ou Boston Animal Control, eles devem entrar em contato com o proprietário para certificar se a vacina antirrábica do animal está em dia. Isto é importante porque a pessoa que foi mordida pode precisar de tratamento preventivo contra raiva.